

Information om Questran, pulver til oral suspension 4 g

Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen. Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Questran til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
- Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som De skal læse, før de tager Questran
3. Sådan skal De tage Questran
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Questran binder tarmens galdesyrer, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyrer til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.

De kan bruge Questran til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. De kan også bruge Questran mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diaré som skyldes for meget galdesyre i tarmen.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE BRUGER QUESTRAN

Tag ikke Questran hvis:

- De er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Questran, pulver til oral suspension.
- De har fuldstændig blokering af galdevejene (med meget svær gulsot).
- De har sivende eller blodig diaré.

Særlige forholdsregler

Questran kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin, samt folinsyre. Tal med Deres læge om tilskud af folinsyre og vitaminer.

Fortæl Deres læge hvis De lider af:

- Diabetes.
- Nedsat stofskifte eller har
- leverproblemer.
- Dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan tage Questran sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De tager:

- blodfortyndende medicin,
- medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin),
- vanddrivende medicin (chlorthiazid),
- anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre),

- medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin),
- epilepsimedicin (phenobarbital),
- medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner),
- hjertemedicin (digoxin).

De skal tage medicinen mindst en time før eller 4-6 timer efter Questran.

Brug af Questran sammen med mad og drikkevarer

De kan udrøre Questran i vand, saft, juice eller andre drikkevarer. De kan også udrøre Questran i supper eller frugtmos.

Graviditet og Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Questran efter lægens anvisning.

Amning:

Erfaringer med Questran er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Questran

Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. Questran indeholder 3,15 g saccharose pr. dosisbrev. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil. Questran kan være skadeligt for tænderne.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE QUESTRAN

Dosering:

Voksne:

1-2 breve (4-8 g) 3 gange daglig.

Børn:

½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til voksendosis.

De må ikke tage Questran tørt. De skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtag. De kan også blande pulveret i mad.

De skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran.

Har De taget for meget Questran?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Questran, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Questran.

Har De glemt at tage Questran?

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De bare fortsætte med næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Questran kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne og meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

- Allergiske reaktioner med hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Søg straks læge eller skadestue.
- Forstoppelse med voldsomme mavesmerter. Søg straks læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Knogleskørhed (på grund af D-vitamin mangel), blødningstendens (på grund af K-vitamin mangel). Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen, kvalme, opkastning, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Halsbrand, appetitmangel, fedtdiaré (ved anvendelse af høje doser), udslæt, irritation af hud og slimhinder.

Sjældne og meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

- Smerter i bughulen.
- Allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Natteblindhed (på grund af A-vitaminmangel).

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>.

5. OPBEVARING

Opbevar Questran utilgængeligt for børn.

Brug ikke Questran efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Questran indeholder

- Det aktive stof i Questran er colestyramin.
- De øvrige indholdsstoffer er vandfri citronsyre (E330), polysorbat 80 (E433), kelcolloid (E405), akaciegummi (E414), appelsinsmagsstof og saccharose (3,15 g per brev).

Pakningsstørrelser:

HER SKAL PAKNINGSTØRRELSER ANFØRES JF. MÆRKNINGSBEKENDTGØRELSEN §35, STK 1, PKT. 12!!

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

Bristol-Myers Squibb AB
Box 15200
S-167 15 Bromma
Sverige

Fremstiller:

Bristol-Myers Squibb
Usine de Meymac
Meymac, Frankrig

Repræsentant i Danmark:

Bristol-Myers Squibb
Lyngby Hovedgade 98
2800 Lyngby

Denne indlægsseddel blev senest opdateret august 2006